



جدول ۱. نام عمومی، نام تجاری، شرکت تهیه کننده، فرمولاسیون و دُز توصیه شده قارچ‌کش‌های استفاده شده.

نام عمومی قارچ‌کش	نام تجاری قارچ‌کش	نام شرکت تهیه کننده	فرمولاسیون	دُز توصیه شده مزرعه‌ای
بردوفیکس	بردوفیکس	باغبان تاک	SC /۱۸	۳ در هزار
آیپرودیون + کاربندازیم	رورال تی اس	گل سم گرگان	WP /۵۲/۵	۱/۵ در هزار
مانکوزب	مانزب	آریا	WP /۸۰	۲ در هزار
کوپر اکسی کلراید	کوپراویت	Biesterfeld یونان	WP /۳۵	۳ در هزار
کاربندازیم	باویستین	آریا	WP /۶۰	۲ در هزار
بنومیل	بنلت	اگروشیمی	WP /۵۰	۲ در هزار
کاپتان	اورتوساید	مشکفام	WP /۵۰	۳ در هزار
استروبی	کروزکسیم متیل	Sinochem Nigbo چین	WG /۵۰	۰/۲ در هزار
کلروتالونیل	داکونیل	Syngenta آمریکا	SC /۷۲	۲ در هزار
زینب	پارازیت	Inpofil هند	WP /۸۰	۳ در هزار

## مواد و روش‌ها

### قارچ

جدایه *Botrytis cinerea* استرین ۱۷۲۶e از مرکز تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور تهیه شد و در کوتاه‌مدت تا زمان استفاده از آنها روی محیط کشت PDA نگهداری شد.

### قارچ‌کش‌ها

قارچ‌کش‌های مورد استفاده در این تحقیق شامل: استروبی (کروزکسیم متیل /۵۰WG)، کوپراویت (کوپر اکسی کلراید /۳۵WP)، بردوفیکس (بردوفیکس /۱۸SC)، بنلیت (بنومیل /۵۰WP)، داکونیل (کلروتالونیل /۷۵WP)، پارازیت (زینب /۸۰WP)، ارتوساید (کاپتان /۵۰WP)، رورال تی اس (آیپرودیون + کاربندازیم /۵۲/۵WP)، باویستین (کاربندازیم /۶۰WP) و مانزب (مانکوزب /۸۰WP) بودند که مشخصات آنها در جدول ۱ نشان داده شده است.

### تهیه غلظت‌های قارچ‌کش‌ها

به منظور تهیه غلظت‌های مورد نیاز، ابتدا برای همه قارچ‌کش‌ها، با توجه به فرمولاسیون آنها، غلظت ۲۰۰۰ میلی‌گرم بر لیتر از

هنوز مقاومت طبیعی علیه این بیماری در محصول گوجه‌فرنگی مشاهده نشده و کنترل شیمیایی به‌عنوان عمده‌ترین راه برای کاهش پیشرفت آن است (۱۲). قارچ *B. cinerea* یک بیمارگر با پتانسیل زیاد جهت مقاومت به قارچ‌کش‌ها است که این امر به‌خاطر تنوع ژنتیکی، سیکل کوتاه زندگی و تولید مثل فراوان می‌باشد. قارچ‌کش‌ها باعث کاهش خسارت توسط قارچ می‌شوند. اما تکرار استفاده از گروه‌های محدودی از قارچ‌کش‌ها منجر به توسعه مقاومت در قارچ می‌شود (۱۳).

با توجه به خسارت عمده‌ای که سالانه قارچ *B. cinerea* در گلخانه‌های گوجه‌فرنگی وارد می‌سازد، انواع مختلف قارچ‌کش‌ها به صورت بی‌رویه جهت مهار این قارچ استفاده می‌شوند که منجر به بروز مقاومت در این قارچ در برابر بسیاری از قارچ‌کش‌ها شده است. در این پژوهش، تأثیر ۱۰ قارچ‌کش بر رشد میسلیمیوم و جوانه‌زنی کنیدیوم این قارچ بررسی شد. همچنین، تأثیر قارچ‌کش‌ها در جلوگیری از رشد زخم ناشی از قارچ *B. cinerea* روی میوه گوجه‌فرنگی و نیز تأثیر این قارچ‌کش‌ها بر جوانه‌زنی کنیدیوم‌های ایزوله‌های مختلف قارچ *B. cinerea* که از مناطق مختلف استان اصفهان جمع‌آوری شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفت.

### تأثیر قارچ‌کش‌ها روی رشد میسلیمی *B. cinerea*

به منظور انجام این آزمایش، از محیط کشت مدیوم آگار ۲ شامل ۱۰ گرم گلوکز، ۱/۵ گرم  $K_2HPO_4$ ، ۲ گرم  $KH_2PO_4$ ، ۱ گرم  $(NH_4)_2SO_4$ ، ۰/۵ گرم  $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ ، ۲ گرم عصاره مخمر، ۱۰ گرم گلوکز و ۱۲/۵ گرم آگار استفاده شد. غلظت‌های مناسب قارچ‌کش‌ها به صورت توضیح داده شده به دست آمدند و جهت کنترل نیز از محیط کشت به همراه آب مقطر استفاده شد. مقدار ۲۰ میلی‌لیتر از غلظت مناسب ترکیب تهیه شده قارچ‌کش‌ها به همراه محیط کشت در تشتک‌های پتری ۹۰ میلی‌لیتری ریخته و اجازه داده شد تا کاملاً سرد شود. در شرایط کاملاً استریل، از حاشیه در حال رشد یک کلنی هفت روزه قارچ *B. cinerea* که در دمای ۲۵ درجه سلسیوس نگهداری شده بود، یک دیسک از محیط کشت به همراه قارچ با قطر ۵ سانتی‌متر و ارتفاع ۳ میلی‌متر برداشته شد و به صورت وارونه در مرکز محیط کشت PDA به تنهایی به عنوان شاهد و محیط کشت همراه با قارچ‌کش‌ها، در تشتک پتری مایه‌زنی شد و در انکوباتور با دمای ۲۵ درجه سلسیوس و ۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی قرار گرفت. خط رشد آنها بعد از ۳ و ۷ روز اندازه‌گیری و میزان رشد به وسیله یک خط‌کش از چهار نقطه از دیسک گذاشته شده در مرکز پتری اندازه‌گیری شد. برای هر تیمار و شاهد چهار تکرار در نظر گرفته شد. نتایج به دست آمده در فرمول  $I=100((C-T)/C)$  استفاده شده توسط منگ و همکاران (۷) قرار گرفت که در آن I درصد بازدارندگی، C قطر کلنی در شاهد و T قطر کلنی در تیمار می‌باشد. درصد بازدارندگی در مورد هر قارچ‌کش روی رشد میسلیمی قارچ *B. cinerea* به دست آمد. همچنین، غلظت‌هایی که باعث ۵۰٪ بازدارندگی از جوانه‌زنی کنیدیوم‌ها شده بودند با استفاده از نرم‌افزار Polo Plus به دست آمدند.

### تأثیر قارچ‌کش‌ها بر قطر زخم روی میوه

آزمایش به روش دسن و همکاران (۴) در قالب

قارچ‌کش به دست آمد. سپس، با استفاده از روش رقیق‌سازی مکرر (Serial dilution) غلظت‌های ۰/۵، ۱، ۱۰، ۱۰۰، ۱۰۰۰ و ۰/۵ میلی‌گرم بر لیتر از فرمولاسیون قارچ‌کش‌ها به دست آمد که با در نظر گرفتن درصد ماده مؤثره موجود در هر فرمولاسیون، غلظت‌ها بر حسب میزان ماده مؤثره محاسبه گردید و در نهایت در مورد هر کدام از قارچ‌کش‌ها غلظت‌های مختلفی از ماده مؤثره مورد آزمون قرار گرفت.

### تأثیر قارچ‌کش‌ها بر درصد جوانه‌زنی کنیدیوم‌های

#### *B. cinerea*

برای اندازه‌گیری درصد جوانه‌زنی قارچ *B. cinerea* از محیط کشت مدیوم آگار ۱ شامل ۱۰ گرم گلوکز، ۲ گرم  $KH_2PO_4$ ، ۲ گرم  $K_2HPO_4$  و ۱۲/۵ گرم آگار برای یک لیتر آب استفاده شد. مقدار ۲۰ میلی‌لیتر از غلظت مناسب ترکیب تهیه شده قارچ‌کش‌ها به همراه محیط کشت در تشتک‌های پتری ۹۰ میلی‌لیتری ریخته و اجازه داده شد تا کاملاً سرد شود. برای به دست آوردن سوسپانسیون کنیدیوم قارچ‌ها، روی محیط کشت ۱۵ روزه قارچ، آب مقطر ریخته شد تا سطح آن را فرا گیرد. سپس، یک میلی‌لیتر ماده توپین ۸۰ (Tween80) به آن اضافه گردید و تشتک پتری به شدت تکان داده شد تا کنیدیوم‌ها جدا شوند. بعد از قرار دادن یک قطره از سوسپانسیون در زیر لام گلوبول‌شمار، تعداد کنیدیوم‌ها شمارش شد و پس از تعیین غلظت سوسپانسیون کنیدی با اضافه کردن آب مورد نیاز، سوسپانسیون  $2 \times 10^5$  کنیدیوم در هر میلی‌لیتر قارچ در شرایط کاملاً استریل تهیه شد. مقدار ۳۵۰ میکرولیتر از این سوسپانسیون به پتری‌های حاوی محیط کشت به همراه غلظت‌های مختلف قارچ‌کش و همچنین محیط کشت به همراه آب مقطر به عنوان شاهد اضافه شد. پس از گذشت ۲۴ ساعت، در زیر میکروسکوپ، با عدسی چشمی  $40 \times$  تعداد ۵۰ الی ۱۰۰ کنیدیوم شمارش شدند. کنیدیوم‌هایی که طول لوله تندش آنها از طول کنیدیوم بیشتر بود جوانه‌زده در نظر گرفته شد و درصد کنیدیوم‌های جوانه‌زده در مقایسه با شاهد پس از ۲۴ ساعت به دست آمد.

جدول ۲. مشخصات جدایه‌های *B. cinerea* جمع‌آوری شده از گلخانه‌های استان اصفهان.

نام جدایه	محل جمع‌آوری	گیاه میزبان	تاریخ جمع‌آوری
EF1	اصفهان - شهرضا	بادمجان	دی ماه ۱۳۹۱
EF2	اصفهان - فلاورجان	بادمجان	بهمن ماه ۱۳۹۱
EF3	اصفهان - فلاورجان	گوجه‌فرنگی	بهمن ماه ۱۳۹۱
EF4	اصفهان - شهرضا	گوجه‌فرنگی	بهمن ماه ۱۳۹۱

میوه، ساقه، شاخه و برگ‌های گوجه‌فرنگی و بادمجان جمع‌آوری و به آزمایشگاه منتقل شدند که در جدول ۲ مشخصات آنها نشان داده شده است. بعد از انتقال، نمونه‌ها روی محیط PDA کشت داده شدند. پس از کشت اولیه، نمونه‌ها از لحاظ مورفولوژیک در زیر میکروسکوپ بررسی و پس از تأیید خصوصیات مورفولوژیک شامل قطر کنیدیوم، قطر میسلیم و نحوه تشکیل کنیدیوم‌ها روی کنیدیوفور، اقدام به خالص‌سازی و تکثیر نمونه‌ها گردید. با توجه به منطقه، گلخانه و محل جمع‌آوری، چهار جدایه جمع‌آوری گردید که شامل جدایه‌های EF1، EF2، EF3 و EF4 بود و برای مقایسه یک جدایه نیز از مؤسسه گیاه‌پزشکی کشور گرفته شد و تحت عنوان Tp2 نامگذاری شد.

جهت بررسی تأثیر قارچ‌کش‌ها بر جدایه‌ها، غلظت‌های مختلف قارچ‌کش مورد آزمایش قرار گرفتند و غلظت‌هایی که باعث ۵۰٪ بازدارندگی از جوانه‌زنی کنیدیوم‌ها شده بودند با استفاده از نرم‌افزار Polo Plus به دست آمدند و در ایزوله‌های مختلف مورد مقایسه قرار گرفتند. جهت تعیین تأثیر قارچ‌کش‌ها بر میزان جوانه‌زنی کنیدیوم‌های این قارچ از محیط کشت مدیوم آگار ۱ و سوسپانسیون کنیدیوم با غلظت  $2 \times 10^5$  کنیدیوم در میلی‌لیتر استفاده شد.

## نتایج و بحث

### تأثیر قارچ‌کش‌ها بر جوانه‌زنی کنیدیوم‌های قارچ

#### *B. cinerea*

تأثیر قارچ‌کش‌های رایج در گلخانه بر جوانه‌زنی قارچ *B. cinerea* مورد بررسی قرار گرفت و بر حسب داده‌های

طرح کاملاً تصادفی در ۱۱ تیمار و سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل میوه‌های گوجه‌فرنگی به همراه قارچ *B. cinerea* و ۱۰ قارچ‌کش و یک تیمار شامل میوه گوجه‌فرنگی به همراه قارچ *B. cinerea* و آب به عنوان شاهد بود.

میوه‌ها ابتدا چهار الی پنج دقیقه در آب مقطر معلق شدند. قارچ‌کش‌ها با دُز توصیه شده (جدول ۱) روی میوه‌هایی که با سوزن روی آنها سوراخ‌هایی ایجاد شده بود محلول‌پاشی شدند تا زمانی که به صورت روان درآمدند. پس از خشک شدن، یک قطعه ۵/۰ سانتی‌متری از یک کلنی ۱۴ روزه قارچ *B. cinerea* در زخم ایجاد شده در میوه‌ها قرار گرفت. تیمار کنترل با آب مقطر انجام شد. هر آزمایش در سه تکرار انجام شد. میوه‌ها در کیسه‌های پلاستیکی استریل در رطوبت نسبی ۹۰ تا ۹۵ درصد قرار گرفتند تا توسعه بیماری تسریع شود. تمام بسته‌ها برای چهار روز در دمای ۲۳ درجه سلسیوس با دوره نوری ۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی قرار داده شدند. این آزمایش دو مرتبه تکرار شد و پس از ۴ روز، قطر زخم رشد کرده در اثر قارچ *B. cinerea* اندازه‌گیری شد و تأثیر قارچ‌کش‌ها در بازدارندگی از رشد زخم ناشی از قارچ *B. cinerea* روی میوه گوجه‌فرنگی به دست آمد.

### تأثیر قارچ‌کش‌ها بر ایزوله‌های مختلف قارچ

#### *B. cinerea*

جهت بررسی تأثیر قارچ‌کش‌های مختلف بر قارچ بوتریتیس و بررسی و مقایسه با جدایه‌های موجود در طبیعت، در فواصل زمانی همراه تا آذرماه سال ۱۳۹۱ از گلخانه‌های فلاورجان و شهرضا در اصفهان، نمونه‌های مشکوک به این قارچ از روی

جدول ۳. مقایسه اثر غلظت بازدارندگی ۵۰٪ (IC<sub>۵۰</sub>) قارچ‌کش‌ها (میلی‌گرم بر لیتر) بر درصد جوانه‌زنی کنیدیوم‌های

قارچ *Botrytis cinerea*

قارچ‌کش	mg/L (95%FL) IC <sub>۵۰</sub>	IC <sub>۹۰</sub>	۲
کاربندازیم	۰/۰۹۷ (۰/۰۶۸-۰/۱۳۷)	۴/۴۶۴	۳/۳۱
بنومیل	۰/۱۰۶ (۰/۰۹۵-۰/۱۱۷)	۰/۵۱۹	۸/۵۳
مانکوزب	۰/۴۹۲ (۰/۳۷۶-۰/۶۳۵)	۱۱/۴۵۰	۱/۵۱
استروبی	۱/۷۶۶ (۱/۵۲۲-۲/۰۲۹)	۱۲/۰۰۲	۳/۵۹
کلروتالونیل	۳/۳۴۵ (۲/۸۴۳-۳/۸۸۱)	۲۴/۲۱۸	۵/۷۶
آپرودیون + کاربندازیم	۶/۶۶۵ (۵/۰۶۲-۹/۲۱۰)	۳۸۱/۶۷۵	۶/۳۰
کاپتان	۳۴/۰۶۵ (۲۶/۹۱۵-۴۳/۱۵۱)	۱۰۵۵/۲۲۷	۷/۱۸
زینب	۶۲/۸۷۷ (۵۲/۹۰۷-۷۴/۱۳۲)	۴۳۶/۴۶۴	۴/۶۳
اکسی کلرور مس	۳۵۱/۳۶۷ (۲۷۲/۱۲۲-۴۴۶/۶۰۱)	۱۹۶۱۵/۷۵	۳/۳۵
بردو	۱۰۹۶/۹۰۲ (۵۵۶/۲۳۸-۳۱۵۱/۸)	۶۷۷۸۹	۴/۰۴

IC<sub>۵۰</sub>: دُز کشنده ۵۰٪، IC<sub>۹۰</sub>: دُز کشنده ۹۰٪، Fiducial limits (FL): حدود اطمینان.


در جداول ۴ و ۵ نشان داده شده است. در بین قارچ‌کش‌ها، بنومیل کمترین میزان IC<sub>۵۰</sub> را داشت و بعد از آن نیز قارچ‌کش کاربندازیم دارای بیشترین تأثیر بر بازدارندگی رشد میسلیمی این قارچ بود. قارچ‌کش‌های اکسی کلرور مس، کاپتان و بردو دارای بیشترین مقدار IC<sub>۵۰</sub> بودند که نسبت به سایر قارچ‌کش‌ها تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشتند. در این بین، اکسی کلرور مس کمترین تأثیر را بر رشد میسلیمی قارچ *B. cinerea* داشت.

با توجه به جداول ۴ و ۵ مشاهده می‌شود که بجز در مورد قارچ‌کش‌های بردو و زینب، در سایر قارچ‌کش‌ها مقدار IC<sub>۵۰</sub> بعد از گذشت ۷ روز بیشتر از مقدار محاسبه شده بعد از ۳ روز می‌باشد. همانطور که در شکل‌های ۱ و ۲ مشاهده می‌شود، در مورد قارچ‌کش بنومیل که بیشترین تأثیر را بر رشد میسلیمی این قارچ داشت، درصد بازدارندگی در غلظت‌های مختلف بعد از ۷ روز، نسبت به زمان ۳ روز تفاوت چندانی ندارد. در حالی که تفاوت بین درصد بازدارندگی در غلظت‌های کم اکسی کلرور مس بعد از ۳ و ۷ روز بیشتر است که نشان از پایداری کمتر این قارچ‌کش طی زمان نسبت به بنومیل دارد. همچنین، با توجه به این شکل‌ها مشاهده می‌شود که دامنه غلظت‌های مؤثر برای بنومیل بین ۰/۲۵ تا ۰/۴ میلی‌گرم بر لیتر و برای

به‌دست آمده، غلظت لازم برای ۵۰٪ بازدارندگی از جوانه‌زنی کنیدیوم‌های این قارچ تعیین شد. داده‌ها در جدول ۳ بر حسب میزان IC<sub>۵۰</sub> مرتب شده‌اند. در میان این قارچ‌کش‌ها، کاربندازیم کمترین میزان IC<sub>۵۰</sub> (۰/۰۹۷ میلی‌گرم بر لیتر) را به خود اختصاص داد و بعد از آن قارچ‌کش بنومیل قرار گرفت. این نتایج تأثیر زیاد قارچ‌کش‌های بنزیمیدازول را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، قارچ‌کش‌های بردو و اکسی کلرور مس به ترتیب با مقادیر ۱۰۹۶/۹ و ۳۵۱/۳۷ میلی‌گرم بر لیتر بیشترین میزان IC<sub>۵۰</sub> را دارا بودند. بی و همکاران (۲) تأثیر کاربندازیم بر جوانه‌زنی کنیدیوم‌های قارچ *B. cinerea* را بررسی کردند. بعد از استفاده از دُز توصیه شده مزرعه‌ای این قارچ‌کش، تولید کنیدی بلافاصله متوقف شد، کنیدی‌ها تخریب شدند و یا به‌صورت غیر طبیعی شروع به تقسیم کردند که نشان از اثر مخرب این قارچ‌کش بر کنیدیوم‌های این قارچ داشت.


تأثیر قارچ‌کش‌ها بر رشد میسلیمی قارچ *B. cinerea*

میزان تأثیر قارچ‌کش‌ها بر بازدارندگی از رشد میسلیمی قارچ *B. cinerea* بعد از ۳ و ۷ روز برآورد شد. نتایج به‌دست آمده



غلظت های قارچ کش ( میلی گرم بر لیتر)

شکل ۱. تأثیر قارچ کش بنومیل بعد از ۳ و ۷ روز بر رشد میسلیمی قارچ *B. cinerea* میانگین‌هایی که حداقل در یک حرف مشترک‌اند با استفاده از آزمون Tukey در سطح ۰/۰۵ درصد اختلاف معنی‌داری با یکدیگر ندارند.



غلظت های قارچ کش ( میلی گرم بر لیتر)

شکل ۲. تأثیر قارچ کش اکسی کلرور مس بعد از ۳ و ۷ روز بر رشد میسلیمی قارچ *B. cinerea* میانگین‌هایی که حداقل در یک حرف مشترک‌اند با استفاده از آزمون Tukey در سطح ۰/۰۵ درصد اختلاف معنی‌داری با یکدیگر ندارند.


دارد و در غلظت‌های ۱۸، ۱۸۰ و ۳۶۰ میلی‌گرم بر لیتر این قارچ‌کش درصد بازدارندگی از رشد میسلیمی بیشتر از درصد بازدارندگی از جوانه‌زنی کنیدیوم‌های این قارچ می‌باشد.

تأثیر قارچ‌کش‌های مختلف بر میزان زخم ناشی از


قارچ *B. cinerea* بر میوه گوجه‌فرنگی

یکی از اثرهای مخربی که قارچ *B. cinerea* بر گوجه‌فرنگی

کسی کلرور مس از ۳/۵ تا ۱۴۰۰ میلی‌گرم بر لیتر می‌باشد. با مقایسه جداول ۳ و ۴ مشاهده می‌شود که میزان IC<sub>۵۰</sub> قارچ‌کش‌های مختلف در جلوگیری از رشد میسلیمی و جلوگیری از جوانه‌زنی کنیدیوم‌های قارچ *B. cinerea* متفاوت می‌باشد. همانطور که در شکل ۳ مشاهده می‌شود، در مورد قارچ‌کش پردو در غلظت‌های مشابه، میزان درصد بازدارندگی رشد میسلیمی و درصد جوانه‌زنی کنیدیوم قارچ *B. cinerea* اختلاف معنی‌داری



شکل ۳. مقایسه بین غلظت‌های مصرفی بردو بر رشد میسلیمی و درصد جوانه‌زنی قارچ *B. cinerea* میانگین‌هایی که حداقل در یک حرف مشترک‌اند، با استفاده از آزمون توکی در سطح ۰/۰۵ درصد اختلاف معنی‌داری با یکدیگر ندارند.



شکل ۴. میزان رشد زخم ناشی از قارچ *Botrytis cinerea* روی میوه گوجه‌فرنگی تحت تیمار با دُز مصرفی (میلی‌گرم بر لیتر) قارچ‌کش‌ها. میانگین‌هایی که حداقل در یک حرف مشترک‌اند، با استفاده از آزمون توکی در سطح ۰/۰۵ درصد اختلاف معنی‌داری با یکدیگر ندارند.

تیمار قارچ‌کش‌های مختلف با دُز توصیه شده و تلقیح قارچ به آن، قطر زخم‌ها بعد از گذشت ۴ روز اندازه‌گیری شد. نتایج در شکل ۴ آورده شده است. قطر زخم ناشی از قارچ‌ها در تمام

می‌گذارد تخریب میوه و ایجاد پوسیدگی در آن است. بنابراین، تأثیر قارچ‌کش‌های مختلف بر کنترل این پوسیدگی بر میوه اندازه‌گیری شد. بدین منظور، پس از ایجاد زخم در میوه و

جدول ۴. مقایسه تأثیر بازدارندگی قارچ‌کش‌ها (IC<sub>۵۰</sub>) بر جوانه‌زنی کنیدیوم‌ها در جدایه‌های *B. cinerea*

بنومیل	مانکوزب	استروبی	کاربندازیم	کلروتالونیل	آیپرودیون + کاربندازیم	کاپتان	زینب	اکسی کلرور مس	بردو	قارچ‌کش جدایه
۰/۰۸۷	۰/۳۴۸	۱/۷۵۶	۱۰/۹۲۴	۴/۹۴۳	۷/۵۸۷	۱۵/۳۲	۴۱/۵۲۵	۱۶/۱۶	۱۱۷۸/۶۵۵	EF1
۰/۱۶۱	۰/۳۲۷	۲/۵۴۳	۱۳/۷۶	۶/۷۰۸	۷/۳۸۷	۵/۱۶۹	۲۹/۱۷۹	۴۸/۴۵۸	۱۳۴۳/۹۷۹	EF2
۰/۱۹۵	۰/۱۷۹	۲/۳۱۶	۱۰/۴۵۴	۸/۴۲۱	۷/۴۸۸	۱۰/۷۳	۱۶۱/۱۴۸	۹۲۸/۷۲۹	۱۱۱۱/۱۰۷	EF3
۰/۱۵۲	۰/۲۹۹	۳/۰۴۸	۰/۹۳۹	۵/۵۳۳	۹/۲۸۹	۲۲/۵۶۳	۳۹/۷۸	۶۹/۰۲	۷۵۷/۹۹۵	EF4
۰/۲۱۲	۰/۶۱۶	۳/۵۳۲	۰/۱۶۳	۴/۶۴۷	۱۲/۶۹۶	۶۸/۱۳۱	۷۸/۵۹۷	۱۰۰۳/۹۰۸	۶۰۹۳/۹	Tp2

جوانه‌زنی کنیدیوم‌های جدایه‌های جمع‌آوری شده می‌باشد. میزان IC<sub>۵۰</sub> این قارچ‌کش در مقیاس با دو قارچ‌کش دیگر با ۵۰ IC بالا، یعنی اکسی کلرور مس و زینب، تفاوت زیادی داشت. از سوی دیگر، قارچ‌کش‌های بنومیل و مانکوزب دارای بیشترین بازدارندگی روی این قارچ‌ها بودند. در میان جدایه‌های جمع‌آوری شده، جدایه EF3 در برابر قارچ‌کش‌های اکسی کلرور مس و زینب مقاومت قابل ملاحظه‌ای نسبت به سایر جدایه‌ها نشان داد. همچنین، جدایه EF4 نسبت به قارچ‌کش کاربندازیم و جدایه EF1 در برابر بنومیل در قیاس با سایر جدایه‌ها به صورت قابل توجهی حساسیت و عدم جوانه‌زنی در کنیدیوم‌ها داشت.

در آزمایش‌هایی که توسط پاپلوماتاس و همکاران (۷) صورت گرفت، جدایه‌های متفاوتی از این قارچ، حساسیت‌های گوناگونی به قارچ‌کش‌های کاربندازیم، آیپرودیون و دیتوفن کارب نشان دادند. با توجه به جدول ۶، مشخص شد که در بعضی موارد جدایه‌های جمع‌آوری شده با جدایه اصلی موجود در آزمایشگاه از لحاظ حساسیت و مقاومت به قارچ‌کش‌ها تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارند. قارچ *B. cinerea* کشت شده در آزمایشگاه در رابطه با قارچ‌کش‌های بردو، مانکوزب و کاپتان مقاومت بیشتری نسبت به جدایه‌های جمع‌آوری شده داشت. در صورتی که در مورد قارچ‌کش کاربندازیم حساسیت بسیار

تیمارهای قارچ‌کش اختلاف معنی‌داری با شاهد داشت و نشان داد که تمام قارچ‌کش‌های استفاده شده تا حدود زیادی از رشد زخم جلوگیری کرده بودند.

با توجه به شکل ۴، در میان قارچ‌کش‌های استفاده شده، اکسی کلرور مس به همان صورت که در جلوگیری از رشد میسلیمی و جوانه‌زنی کنیدیوم‌های این قارچ تأثیر کمتری نسبت به دیگر قارچ‌کش‌ها داشت، در جلوگیری از رشد زخم ناشی از *B. cinerea* نیز موفقیت کمتری داشت. قطر زخم ایجاد شده در میوه با تیمار قارچ‌کش بردو اختلاف معنی‌داری با اکسی کلرور مس نداشت. از سوی دیگر، قارچ‌کش بنومیل تا حدود بسیار زیادی از رشد زخم بر میوه جلوگیری کرده بود و بیشترین اثر را در جلوگیری از رشد زخم ناشی از این قارچ داشت. بعد از بنومیل، قارچ‌کش‌های کاربندازیم و مانکوزب بیشترین تأثیر را در کنترل زخم ناشی از قارچ *B. cinerea* داشتند که این دو قارچ‌کش نیز با یکدیگر اختلاف معنی‌داری نداشتند.

#### مقایسه غلظت بازدارنده ۵۰٪ قارچ‌کش‌ها (IC<sub>۵۰</sub>) بر

#### جوانه‌زنی کنیدیوم‌ها در جدایه‌های *B. cinerea*

با توجه به میزان IC<sub>۵۰</sub> ایزوله‌های جمع‌آوری شده (جدول ۴) مشخص شد که بردو کم‌اثرترین قارچ‌کش جهت جلوگیری از



قارچ‌کش‌های کاربندازیم و بنومیل که هر دو متعلق به گروه بنزیمیدازول می‌باشند تاثیر زیادی بر روی قارچ *B.cinerea* دارند که بازدارندگی زیادی این ترکیبات و تاثیر کم قارچ‌کش‌های مسی بر روی این قارچ در آزمون مقایسه رشد زخم‌های ناشی از آلودگی به این قارچ نیز تایید شد. ایجاد مقاومت در جدایه‌های مختلف قارچ *B.cinerea* در مقابل قارچ‌کش‌ها یکی از موارد مهمی می‌باشد که در این آزمایشات به ما یادآور می‌شود.

بیشتری در جوانه‌زنی کنیدیوم‌ها از خود نشان داد.

## نتیجه‌گیری

در آزمون‌های صورت گرفته قارچ‌کش‌های متعلق به گروه ترکیبات مسی جزو ضعیف‌ترین گروه قارچ‌کشی بر روی رشد میسلیمی و جوانه‌زنی کنیدیوم‌های قارچ *B.cinerea* بودند که هر دو قارچ‌کش اکسی‌کلرور مس و بردو در این دو آزمون در کم‌ترین سطح جهت بازدارندگی قرار داشتند. از سوی دیگر با توجه به آزمون‌های صورت گرفته مشخص شد

## منابع مورد استفاده

1. Ambethgar, V., M. Swamiappan, R.J. Rabindra and R. Rabindran. 2010. Effect of selected fungicides on *in vitro* vegetative growth of *Beauveria bassiana* (Balsamo) Vuillemin, a pathogen of rice leaf folders. J. Biol. Control 24: 85-87.
2. Bi, C.W., J.B. Qiu, M. G. Zhou, C.J. Chen and J.X. Wang. 2009. Effects of carbendazim on conidial germination and mitosis in germlings of *Fusarium graminearum* and *Botrytis cinerea*. Int. J. Pest Manage. 55(2): 157-163.
3. Chapeland, F., R. Fritz, C. Lanen, M. Gredt and P. Leroux. 1999. Inheritance and mechanisms of resistance to anilinopyrimidine fungicides in *Botrytis cinerea* (*Botryotinia Fuckeliana*). Pestic. Biochem. Physiol. 64: 85-100.
4. Desen, N., N. Ozer and N. Delen. 2012. Sensitivity of *Botrytis cinerea* isolate against some fungicides used in vineyard. Afr. J. Biotechnol. 11: 1892-1899.
5. Li, Z., P.P. Li, H.L. Yang, J.Z. Liu and Y.F. Xu. 2012. Mechanical properties of tomato exocarp, mesocarp and locular gel tissues. J. Food Eng. 111: 82-91.
6. Liu, W., P. Leroux and S. Fillinger. 2008. The HOG1-like MAP kinase Sak1 of *Botrytis cinerea* is negatively regulated by the upstream histidine kinase Bos1 and is not involved in dicarboximide- and phenylpyrrole-resistance. Fungal Genet. Biol. 45: 1062-1074.
7. Meng, Z., Y. Wei, D. Xu, S. Hao and J. Hu. 2007. Effect of 2-allylphenol against *Botrytis cinerea* Pers., and its residue in tomato fruit. Crop Prot. 26: 1711-1715.
8. Paplomatas, E.J., A.C. Pappas and D. Antoniadis. 2004. A relationship among fungicide-resistant phenotypes of *Botrytis cinerea* based on RAPD analysis. J. Phytopathol. 152: 503-508.
9. Suarez, M.B., K. Walsh, N. Boonham, T. O'Neill, S. Pearson and I. Barker. 2005. Development of real-time PCR (TaqMan®) assays for the detection and quantification of *Botrytis cinerea* in planta. Plant Physiol. Biochem. 43: 890-899.
10. Touhidul Islam, Md., S.J. Castle and S. Ren. 2010. Compatibility of the insect pathogenic fungus *Beauveria bassiana* with neem against sweetpotato whitefly, *Bemisia tabaci*, on eggplant. Entomol. Exp. Appl. 134: 28-34.
11. Van der Heyden, H., O. Carisse and L. Brodeur. 2012. Comparison of monitoring based indicators for initiating fungicide spray programs to control *Botrytis* leaf blight of onion. Crop Prot. 33: 21-28.
12. Van Zyl, S.A., J.C. Brink, F.J. Calitz, S. Coertze and P.H. Fourie. 2010. The use of adjuvants to improve spray deposition and *Botrytis cinerea* control on Chardonnay grapevine leaves. Crop Prot. 29: 58-67.
13. Zhao, H., Y.K. Kim, L. Huang and C.L. Xiao. 2010. Resistance to thiabendazole and baseline sensitivity to fludioxonil and pyrimethanil in *Botrytis cinerea* populations from apple and pear in Washington State. Postharvest Biol. Technol. 56: 12-18.